

LES ICHNEUMONIDES DE QUÉBEC

(Continué de la page 84).

38. Gen. *Ischnus*, Grav. (Ischne).(De *ischnos*, grêle ; allusion au pédicule de l'abdomen).

Ces insectes se distinguent particulièrement des Ichneumons par le 1er segment abdominal qui est poli et brillant.
 Thorax roux ;

Toutes les hanches rousses..... 1. *pyriformis* n. sp.

Les 4 hanches antérieures jaune-blanc 2. *volens*, Cress.

Thorax noir ;

Abdomen roux ;

Tarses postérieurs blancs 3. *lentus*, n. sp.

Tarses postérieurs bruns ;

Hanches rousses, 4. *ruficornis*, n. sp.

Hanches noires..... 5. *placidus*, n. sp.

Abdomen noir ou noir jaune ;

Métathorax taché de blanc ou de jaune ;

Abdomen à extrémité rousse..... 6. *contiguus*, Cress.

Abdomen noir, à extrémité noire.. 7. *exilis*, n. sp.

Méthathorax noir, sans taches ;

Ecusson blanc..... 8. *scutellatus*, n. sp.

Ecusson noir ;

Face blanche..... 9. *impressus*, n. sp.

Face noire..... 10. *parvus*, n. sp.

1. *Ischnus pyriformis*. (Ischne pyriforme). *nov. sp.*

♀ — Long. .43 pouce. D'un roux uniforme dans toute ses parties. Antennes enroulées, tricolores, rousses à la base, noires à l'extrémité avec un anneau blanc au milieu. Thorax finement ponctué, le collier en dessus avec l'écusson d'un jaune roussâtre, les antennes avec les environs de l'écusson, noir ; métathorax sans carènes bien distinctes. Ailes hyalines, nervures brunes, stigma noir avec une tache blanche à la base, aréole pentagonale, sub-triangulaire. Abdomen allongé, linéaire, poli, brillant, les incisures des segments resserrées, le 6e segment rétréci à la base et élargi en arrière, ce qui lui donne une apparence pyriforme en s'unissant avec le suivant.

Quatre spécimens, 2 ♀ et 2 ♂. Le ♂ à la face, les orbites, le chaperon, les écailles alaires, le collier, l'écusson, avec les 4 hanches antérieures jaunes, le 6e segment abdominal n'a aucun rétrécissement à la base comme dans la femelle, les antennes sont noires en dessus et roussâtres en dessous, et non enroulées.

2. *Ischnus volens*, Cress. (Ischne bienveillant.)

Ischnus volens, Cress. Proc. Ent. Soc. Phil. III, p. 192. ♂.

Un seul spécimen ♂. Var. les 6 premiers segments abdominaux ont avec barre noire indéterminée à la base.

3. *Ischnus lentus*. (*Ischnus lent*). *nov. sp.*

♂—Long. .28 pouce. Noir et couvert d'une courte pubescence grisâtre. Antennes courtes, fortes, droites. Dos du mésothorax impressionné en avant, écailles alaires noires; métathorax rugueux, à lignes soulevées distinctes. Ailes légèrement enfumées, nervures et stigma, noir; aréole pentagonale. Pattes noires, les jambes antérieures avec leurs tarses, roussâtres, les tarses postérieurs blancs au milieu. Abdomen en ovale allongée, légèrement déprimé, le premier segment allongé, poli, noir à la base, le reste de l'abdomen roux à l'exception des deux derniers segments qui sont aussi noirs.

Trois spécimens, 2 ♂ et 1 ♀. Très remarquable par ses tarses blancs.

4. *Ischnus ruficornis*. (*Ischne cornes-rousses*). *nov. sp.*

♂—Long. 22 pouce. Noir; le chaperon, les palpes, les mandibules, les antennes, les écailles alaires, les pattes et l'abdomen, d'un noir plus ou moins foncé. Thorax brillant, légèrement pubescent; métathorax à lignes soulevées distinctes, le bassin postérieur strié transversalement. Ailes hyalines, nervures brunes, pâles à la base, stigma jaunâtre; aréole pentagonale. Hanches rousses de même que les pattes, les postérieures avec l'extrême sommet des cuisses, la base et l'extrémité des jambes et les tarses, d'un brun plus ou moins foncé. Abdomen assez court, en ovale allongée, à premier segment canaliculé et poli.

Deux spécimens ♂. Les antennes rousses le distinguent à première vue.

5. *Ischnus placidus*. (*Ischne placide*). *nov. sp.*

♂—Long. .20 pouce. Noir, les orbites antérieurs élargis inférieurement, le chaperon, le bord supérieur des mandibules, les palpes, les écailles alaires avec les 4 trochantins antérieurs, blanc. Antennes fortes, plus courtes que le corps, droites, sétacées. Thorax allongé

brillant, des du mésothorax impressionné, métathorax sub-sépineux aux angles, fortement ponctué. Ailes très légèrement enfumées, iridescentes, nervures brunes, pâles à la base, stigma brun, aréole pentagonale. Pattes rousses, les hanches, les 4 trochantins antérieurs en dessus, les postérieurs entièrement, le sommet des cuisses postérieures, l'extrémité de leurs jambes avec les tarses, noir plus ou moins foncé. Abdomen en ovale allongée, le premier segment assez court, noir à la base, roux dans le reste avec les segments 2 et 3, le reste noir.

Trois spécimens ♂.

6. *Ischnus contiguus*, Cress. (Ischne voisin).

Ischnus contiguus, Cress. Proc. Ent. Soc. Phil. III, p. 100, ♂.

Quatorze spécimens ♂. Dans la plupart, l'extrémité des 1er et 2e segments abdominaux est jaune et non rousse.

7. *Ischnus exilis*. (Ischne grêle), *nov. sp.*

♂—Long. .25 pouce. Noir, très-grêle, les orbites s'élargissant en dessous des antennes et au dessus des yeux, le chaperon, une tache au milieu de la face, une tache sur chaque mandibule avec les palpes, blanc. Antennes aussi longues que le corps, sétacées, droites, noires avec un petit anneau blanc au delà du milieu, le 3e article avec un très petit anneau roux à la base. Thorax noir, les écailles alaires, la suture en avant, une petite ligne au dessous, le collier, une ligne oblique sur le prothorax en arrière des hanches antérieures, une petite tache sur les flanes en avant des hanches intermédiaires, l'écusson et le post-écusson, une petite tache en arrière des ailes postérieures, une grande tache sur la partie-postérieure du métathorax, avec une autre petite de chaque côté, d'un blanc net. Ailes hyalines, nervures brunes, stigma jaunâtre, aréole pentagonale. Pattes d'un jaune roux, les 4 trochantins antérieurs avec les hanches en partie et les tarses postérieurs excepté à la base et à l'extrémité, blanc. Hanches noires avec taches blanches; les cuisses postérieures avec l'extrémité de leurs jambes brunâtres. Abdomen allongé, linéaire, noir, les segments 1, 2, 3 et 4 marginés plus ou moins largement de roux postérieurement, le 2e avec une petite tache rousse de chaque côté à la base.

Trois spécimens ♂, bien distincts de l'*albitarsis*, Cress.

8. *Ischnus scutellatus*. (Ischne à écusson blanc). *nov. sp.*

♂—Long. 28. pouce. Noir; les orbites antérieurs élargis inférieurement avec l'écusson, blanc. Antennes noires, à 3e article très petit et roux. Mésothorax finement ponctué, pubescent, sans impressions

distinctes, métathorax finement ponctué, pubescent, à lignes soulevées peu prononcées. Ailes hyalines, nervures brunes, stigma pâle; aréole pentagonale. Pattes noires, obscurément tachées de roussâtre. Abdomen noir, le 2e segment plus ou moins lavé de roussâtre, le 3 marqué de roux postérieurement, les terminaux tachés de blanc à l'extrémité; le 1er long, poli, brillant.

Un spécimen ♂.

9. *Ischnus impressus*. (Ischne impressionné) *nov. sp.*

♂—Long. .20 pouce. Noir, brillant; la face excepté une ligne au milieu, les mandibules, les palpes le scape en dessous, les écailles alaires avec les 4 trochantins antérieurs en dessous, blanc. Antennes fortes, sétacées, droites, noires. Mésothorax à impressions très distinctes; métathorax à lignes soulevées bien apparentes. Ailes légèrement brunes, nervures brunes, pâles à la base, stigma brun; aréole pentagonale. Pattes rousses, les hanches et les trochantins noirs, les pattes postérieures avec l'extrémité des cuisses et des jambes et leurs tarses plus ou moins obscurs. Abdomen linéaire, s'élargissant graduellement de la base à l'extrémité, noir, le 3e segment plus ou moins roux, le 1er canaliculé en dessus.

Quatre spécimens ♂; le 2e segment est aussi quelquefois en partie roux.

10. *Ischnus parvus*. (Ische petit). *nov. sp.*

♂—Long. .18 pouce. Noir; les mandibules avec le scape en dessous roussâtres, les palpes avec les écailles alaires d'un jaune pâle. Antennes noires, le 1er et le 2e article marqués de jaune supérieurement. Dos du mésothorax impressionné, métathorax ponctué, à lignes peu soulevées. Ailes légèrement enfumées, nervures brunes, pâles à la base, stigma brun; aréole pentagonale. Pattes rousses, les postérieures plus ou moins lavées de brun, hanches noires. Abdomen linéaire, allongé, d'un brun plus ou moins foncé, le 2e segment un peu plus pâle.

Un seul spécimen ♂.

39 Gen. **STILPNUS**, Gravenhorst, (Stilpno).

(De *stilpnos*, brillant).

Stilpnus Canadensis. (Stilpne du Canada). *nov. sp.*

♂—Long. .18 pouce. Noir brillant; les palpes avec les écailles élaïres jaunâtres. Antennes fortes, plus longues que la moitié du corps, à articles presque carrés, le scape taché de roussâtre en dessous. Mésothorax impressionné de chaque côté en avant; métathorax portant plusieurs lignes soulevées formant diverses cellules. Ailes sub-hyalines,

nervures et stigma brun pâle, ce dernier très grand, triangulaire ; aréole parfaite, pentagonale. Pattes rousses, hanches noires, les 4 antérieures tachées de roux en dessous ; les 4 cuisses antérieures à la base les postérieures entièrement, avec l'extrémité des jambes et les tarses. noir. Abdomen poli, luisant, en ovale allongée. Le premier segment canaliculé, le segment 3 avec une bande rousse à la base et au sommet, peut-être quelquefois entièrement roux.

Un seul spécimen ♂, assez voisin de l'*Americanus*, Cress mais s'en distinguant par la coloration de ses pattes et de son abdomen.

40. Gen. **MESOLEPTUS**, Gravenhorst. (Mésolepte).

(De *mesos*, un peu, et *leptos*, grêle ; allusion au pédicelle de l'abdomen).

Ces insectes, dans leur apparence générale, se rapprochent assez des *Mesostenus* de la division des Cryptides. mais leur aréole, petite, triangulaire, ou absente, empêchera toujours de les confondre.

Ecusson noir, abdomen noir..... 1. *annulipes*, Cress.

Ecusson noir, abdomen roux, ou roux et noir ;

Une aréole aux ailes antérieures..... 2. *flavirictus*, Cress.

Point d'aréole aux ailes antérieures ;

Face noire..... 3. *micans*, n. sp.

Face jaune..... 4. *depressus*, n. sp.

Ecusson blanc ou roux ;

Abdomen roux et noir ;

Tarses postérieurs blancs..... 5. *honestus*, Cress.

Tarses postérieurs noirs..... 6. *maculosus*, n. sp.

Abdomen noir, rayé de blanc ;

Métathorax taché de jaune..... 7. *pulcherrimus*, Cress.

Métathorax sans tache ;

Mésothorax avec taches jaunes aux bords.. 8. *decens*, Cress.

Mésothorax sans taches aux bords antérieurs 9. *variabilis* n. sp.

1. *Mesoleptus annulipes*, Cress. (Mésolepte pieds-annelés).

Mesoleptus annulipes, Cress. Proc. Ent. Soc. Phil. III, p. 257, ♀.

Un spécimen ♀ ; le stigma est sans tache blanche à la base.

2. *Mesoleptus flavirictus*, Cress. (Mésolepte à-plis-jaunes).

Mesoleptus flavirictus, Cress. Proc. Ent. Soc. Phil. III, p. 263, ♀.

Deux spécimens. Les antennes à peine teintes de roux à l'extrémité.

3. *Mesoleptus micans*, (Mésolepte brillant). *nov. sp.* ♂

♂—Long. .25 pouce. Noir, brillant, poli; mandibules rousses, de même que les pattes et les antennes en dessous à la base; palpes et écailles alaires jaunâtres. Prothorax gibbeux en avant; métathorax sans lignes soulevées distinctes. Ailes sans aréole, la nervure moyenne va rejoindre la cubitale à son point de jonction avec la sous-cubitale. Les hanches postérieures tachées de noir à la base. Abdomen poli, brillant, allongé, subcylindrique, d'un roux ferrugineux à partir du 2e segment; le 1er segment allongé, grêle, élargi à l'extrémité, noir avec la base du 2e.

Deux spécimens ♂. La singulière disposition de ses ailes pourra peut-être le faire ranger dans quelque autre genre.

4. *Mesoleptus depressus*, (Mésolepte déprimé). *nov. sp.*

♂—Long. .22 pouce. Noir; la face, les mandibules, les joues au dessous des yeux, les palpes, le scape en dessous, les écailles alaires avec un point en avant, les 4 hanches antérieures avec les trochantins d'un jaune pâle. Antennes noires, un peu plus courtes que le corps. Métathorax à carènes peu soulevées. Ailes hyalines, nervures et stigma, brun; point d'aréole. Pattes rousses, les cuisses postérieures avec l'extrémité de leurs jambes et leurs tarses plus ou moins obscures. Abdomen allongé, déprimé, d'un roux sale, excepté à la base et à l'extrémité où il est noir, 1er segment canaliculé, marginé de roux postérieurement, tubercules stimatiques saillants sur les côtés.

Un spécimen ♂.

5. *Mesoleptus honestus*, Cress. (Mésolepte honnête).

Mesoleptus honestus, Cress. Trans. Am. Ent. Soc. II, p. 98, ♂ ♀.

Un seul spécimen ♂. Le mésothorax porte une tache blanche en coin en avant près de la suture dorsale; l'abdomen est obscur à l'extrémité.

6. *Mesoleptus maculosus*. (Mésolepte maculé). *nov. sp.*

♀—Long. .20 pouce. Noir; la face au dessous des antennes, les mandibules, les palpes, jaune. Antennes fortes, plus courtes que le corps, roussâtres à l'extrémité, brunes à la base. Écailles alaires

jaunes. Gousson d'un jaune roux; métathorax avec lignes soulevées, une bande rousse le traversant en arrière vers le bas. Ailes hyalines, nervures brunes, stigma jaunâtre; aréole triangulaire, subpétiolée. Pattes d'un jaune roussâtre, les trochantins avec les 4 hanches antérieures en dessous, jaune-pâle; hanches postérieures entièrement avec les 4 cuisses en dessus, noires. Pattes postérieures rouges avec un anneau noir à la base des cuisses et des jambes, leur extrémité, de même que les tarses, plus ou moins obscure. Abdomen en massue allongée, les segments un peu étranglés à leur suture, noir, le 2e segment excepté à la base, avec le 3e et le 4e, roux, noirs aux côtés, le 2e avec une petite ligne rousse aussi à la base, les segments terminaux obscurément marginés par une ligne pâle, le 1er segment allongé, emaliculé, à stigmates saillants vers le milieu.

Un seul spécimen ♀.

7. *Mesoleptus pulcherrimus*, Cres. (Mésolepte très-beau).

Mesoleptus pulcherrimus, Cress. Trans. Am. Ent. Soc. II, p. 101. ♂.

Deux spécimens ♂. Cette espèce est très variable dans sa coloration. L'un des spécimens a tout le jaune remplacé par du blanc, de plus les trochantins postérieurs sont tachés de noir, leurs cuisses roux-clair ont un petit anneau noir suivi d'un autre plus petit blanc à l'extrémité, les jambes ont aussi un anneau noir près de la base; la forme et la taille cependant ne permettent pas de les séparer.

8. *Mesoleptus decens*, Cress. (Mésolepte décent).

Mesoleptus decens, Cress, Trans. Am. Ent. Soc. II, p. 101, ♂.

Un spécimen ♂. La tête est tachée de roux supérieurement en arrière des yeux, les flancs sont de même tachés de roux au dessus du blanc.

9. *Mesoleptus variabilis*. (Mésolepte variable). *nov. sp.*

♂—Long. .26 ponce. Noir, brillant; la face, les joues au dessous des yeux, les orbites supérieurs, les palpes, le cou, la suture humérale du prothorax, les écailles alaires avec une tache au dessous, les écussons, les flancs entre les pattes antérieures et intermédiaires, les hanches et les trochantins, d'un beau blanc. Antennes grêles, presque aussi longues que le corps, pâles en dessous et dans le bas. Prothorax trilobé, poli, brillant; métathorax sans lignes soulevées distinctes. Ailes hyalines, iridescentes, nervures brunes, stigma brun, aréole trian-

gulaire, pétiolée. Pattes grêles, jaune-pâle; les hanches postérieures tachées de noir à l'extrémité, les cuisses et les jambes de la même paire plus ou moins obscures extérieurement. Abdomen linéaire, allongé, noir avec une petite bande blanche à la suture de tous les segments, le 1er long, grêle, presque égal dans toute sa longueur.

Un seul spécimen ♂.

41. Gen. **TRYPHON**, Gravenhorst. (Tryphon).

L'abdomen chez les Tryphons est tantôt pétiolé et tantôt presque entièrement sessile; l'aréole est toujours triangulaire ou sub-triangulaire, pétiolée ou sessile; elle manque quelquefois.

Ecusson noir, abdomen noir;

Abdomen noir, ou à segments marginés de jaune;

Aréole présente 1. *canaliculatus*, *n. sp.*

Aréole manquant 2. *humeralis*, *n. sp.*

Abdomen noir, segments 2 et 3 jaunes..... 3. *Canadensis*, *n. sp.*

Ecusson pâle, abdomen noir..... 4. *submarginatus*, *Cress.*

Ecusson pâle, abdomen roux, ou roux et noir;

Thorax noir; métathorax tout noir..... 5. *Laurentianus*, *n. sp.*

Thorax roux; métathorax taché de roux.. 7. *sanguineus*, *n. sp.*

Ecusson noir, abdomen roux, ou roux et noir;

Hanches antérieures rousses ou noires;

Tarses postérieurs brunâtres;

Aréole triangulaire, pétiolée;

Ecusson saillant, mais non aplati et creusé en des-

sus..... 8. *communis*, *Cress.*

Ecusson aplati et creusé en dessus postérieure-

ment 9. *seminiger*, *Cress.*

Aréole manquant..... 10. *tardus*, *n. sp.*

Tarses postérieurs blancs;

Abdomen entièrement roux..... 11. *annulatus*, *n. sp.*

Abdomen noir à bandes rousses.... 12. *Moyeni*, *n. sp.*

Hanches antérieures jaunes;

Hanches postérieures noires..... 13. *frontalis*, *Cress.*

Hanches postérieures rousses..... 14. *affinis*, *Cress.*

1. **Tryphon canaliculatus**. (Tryphon canaliculé). *n. sp.*

♀ — Long. .22 ponce. Noir; la face au dessous des antennes, les palpes, le scape en dessous, blanc. Antennes aussi longues que le corps, noires en dessus, brunes en dessous et à l'extrémité. Thorax un peu gibbeux en avant, finement ponctué, les écailles alaires, un point

en avant, une tache en coin sur le devant du mésothorax de chaque côté près de la suture dorsale, blanc. Métathorax sans lignes soulevées à l'exception de deux carènes longitudinales très rapprochées au milieu. Ailes, nervures et stigma noirs, pâles à la base, point d'aréole. Pattes d'un beau jaune roussâtre à l'exception de l'extrémité des jambes postérieures et de leurs tarsi qui sont brunâtres. Abdomen convexe, noir avec une pubescence blanchâtre surtout à l'extrémité, le premier segment assez long, se rétrécissant graduellement vers la base, canaliculée en dessus mais non jusqu'au sommet, les segments terminaux marginés de blanchâtre postérieurement; ventre jaune-pâle au milieu; tarière sortante, noire.

Un seul spécimen ♀.

2. *Tryphon humeralis*. (Tryphon huméral). *nov. sp.*

♀—Long. .18 pouce. Noir; la face au dessous des antennes, le chaperon, les mandibules, les palpes, blanc. Antennes aussi longues que le corps, noires, roussâtres en dessous, le scape jaune en dessous. Thorax poli, brillant, les écailles alaires, une ligne au dessous, une ligne en avant sur le bord du mésothorax se repliant en coin à la suture dorsale, blanc; métathorax sans lignes soulevées bien distinctes. Ailes hyalines, iridescentes, nervures et stigma, brun, ce dernier pâle à la base; aréole triangulaire, subpétiolée. Pattes d'un jaune-roux, les 4 hanches antérieures avec leurs trochantins, blanc, les hanches postérieures noires, l'extrémité des jambes postérieures avec leurs tarsi quelque peu enfumés. Abdomen subsessile, robuste, d'un noir quelque peu ferrugineux, peu foncé sur les segments moyens, le premier segment bicaréné à la base.

Un seul spécimen ♀.

3. *Tryphon Canadensis*. (Tryphon du Canada). *nov. sp.*

♀—Long. .30 pouce. Noir; la face au dessous des antennes, excepté une ligne noire au milieu qui s'unit à une autre transversale bordant le chaperon supérieurement, avec les palpes, jaune-pâle; antennes plus courtes que le corps, noires, roussâtres à l'extrémité, le scape jaune en dessous. Thorax finement ponctué, écailles alaires jaunes, écusson proéminent; métathorax brillant, lignes soulevées peu apparentes. Ailes hyalines, iridescentes, nervures brunes, stigma jaunâtre, aréole triangulaire, subpétiolé. Pattes jaunes, cuisses noires, les 4 antérieures jaunes aux extrémités, toutes les hanches avec l'extrémité des jambes, postérieures noires. Abdomen poli, brillant, noir les segments 2 et 3 d'un beau jaune, le 2e quelquefois taché de noir à la base, le premier segment allongé, faiblement canaliculé; tarière sortante, noire.

Vingt spécimens ♂ & ♀. Le mâle a la face entièrement jaune, quelquefois les 4 cuisses antérieures sont presque toutes jaunes et les hanches plus ou moins tachées de la même couleur, la base du 4e segment abdominal est aussi quelquefois jaune. Espèce des plus aisées à distinguer par sa coloration.

4. *Tryphon submarginatus*, Cress. (Tryphon sous-mariné.)

Tryphon sub-marginatus, Cress. Proc. Ent. Soc. Phil. III, p. 274, ♂.

Huit spécimens, 6 ♂ et 2 ♀. Presque tous les ♂ ont une petite tache blanche à la base des segments abdominaux 3 et 4 au milieu. La ♀ a la même coloration que le ♂ à l'exception que la face est toute noire à part le chaperon dans l'un des spécimens les orbites sont blanches, le scape est blanc en dessous dans l'un et noir dans l'autre.

5. *Tryphon Laurentianus*. (Tryphon Laurentien) *nov. sp.*

♂—Long. 40 ponce. Noir; la face au dessous des antennes à l'exception de 2 points enfoncés de chaque côté du chaperon, les mandibules, les palpes, le scape en dessous, les écailles alaires, les trochantins avec les 4 hanches antérieures, d'un jaune pâle. Antennes roussâtres, presque aussi longues que le corps. Thorax brillant, mésothorax à impressions très marquées, écusson prominent, roux; métathorax à lignes soulevées irrégulières. Ailes légèrement enfumées, nervures et stigma, brun; aréole triangulaire, obliques, très distinctement pétiolée. Pattes d'un jaune roux, les hanches postérieures rousses tachées de noir à la base et en dedans, l'extrémité des cuisses et des jambes postérieures avec leurs tarses d'un brun plus ou moins foncé. Abdomen allongé, linéaire, roux, noir à la base et obscur à l'extrémité, le premier segment long, s'élargissant graduellement vers l'extrémité, avec les stigmates saillants un peu en arrière du milieu, sillonné depuis la base jusqu'au delà des stigmates, son extrémité rousse, la base du 2e segment est plus ou moins largement noire.

Un seul spécimen ♂.

7. *Tryphon Sanguineus*. (Tryphon rouge-sang.) *nov. sp.*

♂—Long. 38 ponce. D'un beau rouge de sang; la face, les joues au dessous des yeux, les mandibules, les palpes, les écailles alaires, un point en avant et une petite ligne au dessous, l'écusson, les 4 hanches

antérieures avec leurs trochantins, d'un jaune pâle. Antennes un peu plus courtes que le corps, rousses avec l'extrémité jaune. Métathorax avec une aréole centrale en carré allongé. Ailes un peu enfumées, nervures noires, stigma jaune; aréole très petite, pétiolée. Pattes d'un roussâtre un peu plus clair que le corps. Abdomen allongé, poli brillant, un peu obscur à l'extrémité, le premier segment canaliculé jusque jusque vers l'extrémité et élargi au sommet.

Trois spécimens ♂. La belle couleur de cette espèce surtout avec ses antennes terminées de jaune, suffit pour la distinguer à première vue de toutes les autres.

8. Tryphon communis, Cress (Tryphon commun).

Tryphon communis, Cress Trans. Am. Ent. Soc. II, p. 103, ♂ ♀.

Vingt spécimens ♂ et ♀.

9. Tryphon seminiger Cress (Tryphon sémi-noir).

Tryphon seminiger, Cress. Proc. Ent. Soc. Phil. III, p. 278, ♀.

Trois spécimens ♀.

10. Tryphon tardus (Tryphon tardif). *nov. sp.*

♀—Long. .38 ponce. D'un noir opaque, face large, finement ponctuée, bouche roussâtre. Antennes presque aussi longues que le corps, roussâtres, noires à la base. Écusson dressé, métathorax finement ponctué, portant une pubescence grisâtre, courte, avec 4 carènes longitudinales peu soulevées. Ailes légèrement enfumées, nervures brunes, stigma jaunâtre, aréole manquant. Pattes rousses, les trochantins, les hanches, les cuisses postérieures avec l'extrémité de leur jambes, noir. Abdomen d'un jaune roux, brillant, poli, noir à l'extrémité; le 1er segment court, uni, sans carènes, s'élargissant de la base au sommet, tubercules stigmatiques peu saillants.

Deux spécimens ♀. La forme de son 1er segment abdominal diffère de celle des précédents; peut être appartient-il à un autre genre.

11. Tryphon annulatus. (Tryphon annelé). *nov. sp.*

♀—Long. .30 ponce. Noir; chaperon transversal, brillant. Antennes presque aussi longues que le corps, filiformes, noires avec un anneau blanc au-delà du milieu. Thorax opaque, écusson légèrement soulevé, métathorax avec 4 carènes longitudinales peu soulevées. Ailes très légèrement enfumées, nervures brunes, stigma pâle, aréole petite, triangulaire, oblique, pétiolée. Pattes rousses, les hanches, les trochantins, les cuisses plus ou moins, avec l'extrémité des jambes postérieures, noir. Les 4 tarses postérieurs blanc au milieu.

Un seul spécimen ♀. L'anneau des antennes avec les tarses blancs distinguent à première vue cette espèce de toutes les autres.

12. Tryphon Moyeni. (Tryphon de Moyen). *nov. sp.*

♂—Long. 40 pouce. Noir; la face, les orbites antérieurs, les joues au dessous yeux, les écailles alaires avec un point en avant et une tache en coin sur le bord antérieur des lobes latéraux du mésothorax, jaune. Antennes plus longues que la tête et le thorax, noires avec un large anneau jaune au milieu. Mésothorax à impressions distinctes; métathorax avec une aréole centrale en carré allongé. Ailes légèrement enfumées, nervures brunes, pâles à la base, stigma brun avec une tache pâle à la base; aréole triangulaire, subpétiolée. Pattes d'un jaune sale, les cuisses noires, les jambes postérieures noir plus ou moins foncé, leurs tarses très longs, noirs à la base et à l'extrémité, le milieu blanc, les autres tarses sont aussi en partie blancs au milieu. Abdomen pédiculé, déprimé, allongé, noir; le 3e segment d'un roux obscur, le pédicule grêle, avec projections stigmatiques vers le milieu.

Un spécimen. Nous dédions avec plaisir ce bel insecte à M. l'abbé Moyen, professeur d'histoire naturelle au collège de S. Sulpice, Montréal.

13. Tryphon frontalis. Cress. (Tryphon frontal).

Tryphon frontalis, Cress. Trans. Am. Ent. Soc. II, p. 109, ♀.

Un seul spécimen ♀.

14. Tryphon affinis. Cress. (Tryphon allié.)

Tryphon affinis Cress. Proc. Ent. Soc. Phil. III, p. 277, ♀.

Un seul spécimen ♀.

42. Gen. ALOMYA, Panzer. (Alomye).

La face bombée, avec une aréole parfaite, le plus souvent pentagonale aux ailes antérieures, distinguent particulièrement ces insectes.

1. Alomya pulchra. (Alomye belle), *nov. sp.*

♂—Long. 19 pouce. Noire; face couverte d'une pubescence argentée, le chaperon, les mandibules avec le scape en dessous, roussâtre, les palpes, les écailles alaires avec les trochantins et les hanches antérieures, jaune-pâle. Tête globuleuse, bombée en avant; antennes fortes, plus courtes que le corps, brun-foncé en dessus roussâtres en dessous. Thorax brillant, pubescent, mésothorax à impressions distinctes, écusson légèrement proéminent, creusé sur les côtés en arrière; métathorax à

lignes soulevées distinctes formant une aréole pentagonale. Pattes roussâtres, les hanches, les cuisses (les antérieures plus ou moins) l'extrémité des jambes postérieures avec leurs tarses, noir. Abdomen en ovale allongée, déprimé, roussâtre, noir à la base et à l'extrémité, le pédioule canaliculé et noir en avant, les segments terminaux pubescents.


Un seul spécimen ♂.

Alomya abdominalis. *Alomye abdominale*). *nov. sp.*

♀—Long. .18 pouce. Noire, brillante, bouche et palpes jaunâtres, une ligne jaune transversale immédiatement au dessous des antennes. Antennes d'un brun roussâtre, grenues, brillantes, enroulées à l'extrémité, le premier article renflé et aussi long que les trois suivants réunis. Ecaïlles alaires jaune-pâle. Thorax gibbeux en avant, écusson proéminent, métathorax avec une aréole en carré allongé au milieu. Ailes hyalines, nervures et stigma brun-foncé, aréole subpentagonale. Pattes peu renflées, les cuisses postérieures plus que les autres, d'un roux pâle uniforme. Abdomen subsessile, allongé, poli, brillant, noir, le 2e segment obscurément marginé de roussâtre au sommet, ventre un peu gonflé, d'un blanchâtre presque transparent.

Vingt spécimens ♂ et ♀. Les ♂ ont les antennes moins grenues, plus longues, l'abdomen moins gonflé, blanchâtre cependant.

(A Continuer).



Report of the Entomological Society of the Province of Ontario for the year 1874.—Nos remerciements à qui de droit pour l'envoi de cet important rapport, qui ne le cède en rien en intérêt à ses devanciers. Ce rapport forme une brochure de 62 pages in-8 avec nombreuses gravures exécutées avec un très grand soin. Cette livraison donne l'histoire d'un grand nombre d'insectes nuisibles aux moissons, aux vergers, etc. Le Rév. M. Bethune y donne entre autres choses une histoire complète des sauterelles qui ravagent si sérieusement les moissons dans l'Ouest depuis quelques années surtout.

